



AVES ENDÉMICAS de Canarias

SEIS ESPECIES
Y 30 SUBESPECIES ENDÉMICAS

En Canarias nidifican unas 90 especies diferentes, muchas de ellas cuentan con varias subespecies. Adicionalmente, el número total de aves que visita las islas de forma regular o esporádica es de varios cientos¹.

Hasta seis especies y unas treinta subespecies son endémicas de Canarias, aunque el número real de taxones infraespecíficos no se conoce con exactitud, pues las revisiones de los últimos años apoyadas con análisis moleculares están haciendo reconsiderar algunas clasificaciones. Además, la taxonomía está muchas veces condicionada por el planteamiento que cada autor hace de la sistemática, taxones que para algunos especialistas son subespecies (razas de una misma especie), para otros pueden tener el rango de especie. Los herrerillo canarios resumen muchas de estas contradicciones, hay autores que los ubican dentro del género *Parus*, otros los consideran dentro del género *Cyanistes*². Hay autores que consideran que es una especie con cuatro subespecies endémicas³ (*Parus caeruleus ombriosus* en El Hierro, *P. caeruleus palmensis* en La Palma, *P. caeruleus teneriffae* en La Gomera, Tenerife y Gran Canaria y *P. caeruleus degener* en Lanzarote y Fuerteventura), y autores que consideran que solo las razas de las islas centrales

A ESPECIES CLASIFICADAS POR ISLA

1 Paloma Turquesa

2 Paloma Rabiche

3 Reyzeuelo Canario

4 Mosquitero Canario

5 Pinzón Azul

6 Taravilla Canaria



y occidentales son endémicas, y autores que piensas que en realidad son cuatro especies distintas⁴.

Por otro lado, especies tan emblemáticas como la hubara canaria, *Chlamydotis undulata*, considerada desde hace mucho tiempo como una subespecie endémica, ha sido comparada con las formas del norte de África sin que se hayan encontrado claras diferencias

morfológicas, moleculares⁵ o en el comportamiento⁶.

Las especies endémicas comprenden dos palomas características de las zonas forestales de los bosques de laurisilva y del termófilo canario



AVES ENDÉMICAS de Canarias

(*Columba junoniae* y *C. bollii*), un pinzón azul que tiene dos subespecies, una en el pinar de Gran Canaria (*Fringilla teydea polatzeki*) y otra en el pinar de Tenerife (*F. teydea teydea*), una tarabilla exclusiva de los barrancos de Fuerteventura (*Saxicola dacotiae*), un petirrojo (*Regulus teneriffae*), y un mosquitero (*Phylloscopus canariensis*). Esta última es una de las aves más comunes de Canarias.

Tenerife y Gran Canaria son, con más de un centenar de taxones (especies y subespecies), las islas con mayor diversidad de aves, aunque conviene señalar que también tienen mayor cantidad de formas exóticas.

1. Ramos, J.J. (coord.) 2008. *Anuario ornitológico de las Islas Canarias. 2000-2006*. Fundación Global Nature. Santa Cruz de Tenerife. 304 pp.
2. Garcia-Del-Rey, E., W. Cresswell, C.M. Perrins & A.G. Gosler. 2006. Variable effects of laying date on clutch size in the Canary Island Blue Tits (*Cyanistes teneriffae*). *Ibis*, 148: 564-567.
3. Grant, P. R. 1979. Ecological and morphological variation of Canary Island Blue tits, *Parus caeruleus* (Aves: Paridae). *Biological Journal of the Linnaean Society*, 11(2): 103-129
4. Gill, F.B., B. Slikas & F.H. Sheldon. 2005. Phylogeny of titmice (Paridae): II. Species relationships based on sequences of the mitochondrial cytochrome b gene. *Auk*, 122: 121-143
5. Dawson, B., Y. Idaghdour, A Korrida & C. Jones. 1999. Molecular genetic analysis of the houbara bustard populations. *IFCDW Bi-Annual Report 1998/99*, 2:52-55
 - Broders, O., T. Osborne & M. Wink. 2003. A mtDNA phylogeny of bustard (family Otidae) based on nucleotide sequences of the cytochrome b-gene. *J.Ornithol*, 144: 176-185.
 - Idaghdour, Y., D.Broderick, A.Corrída & F.Chbel. 2004. Mitochondrial control region diversity of the houbara bustard *Chlamydotis undulate* complex and genetic structure along the Atlantic seaboard of North Africa. *Molecular Ecology*, 13: 43-54.
7. Hinz, C. & Heiss, E. M. 1989. The activity pattern of Houbara bustards: Aspects of a field study in the Canary Islands. *Bustard Studies*, 4: 68-79.
 - Gaucher, P., P. Paillat, C. Chappuis, M. Saint Jalme. F. Lotjikhah & M. Wink. 1996. Taxonomy of the Houbara *Chlamydotis undulata* subspecies considered on the basis of sexual and genetic divergence. *Ibis*, 138: 273-282.



